

Detección
CSP/PAS

Vías de Derivación ante CSP/PAS

NOTA: Considerando que en Chile existe una fragmentación de los programas especializados es necesario identificar una posible línea de intervención cuando se detectan situaciones de CSP o PAS. Las CSP pueden estar asociadas a múltiples vulneraciones (abuso sexual, explotación, negligencia, maltrato físico, institucionalización, etc.) o incluso a problemáticas de salud mental. Por lo mismo distintos programas pueden abordar estas situaciones. Se recomienda atender a los siguientes criterios durante el análisis de la situación e integrar en la decisión a los distintos equipos.

- Es CSP (no PAS)
- Niño/a menor de 10 años
- Cercana temporalidad entre MIG o ASI y CSP
- Sintomatología reexperimentación postraumática (memorias, pesadillas o repeticiones en el juego)
- Sin antecedentes de ejercer violencia hacia otros
- CSP asociada a confusión tras ASI o soledad emocional
- NNA desea continuar en PRM
- Competencias y tiempo suficiente

PRM

- Es PAS o CSP indiscriminada hacia pares
- Niño/a mayor de 10 años
- NNA tiende a socializar con niños/as más pequeños
- Antecedentes de ejercer violencia hacia otros.
- Distancia temporal entre ASI y PAS (mayor a 18 meses)
- Sin diagnóstico de estrés postraumático
- CSP o PAS asociada a expresar rabia o frustración
- Proceso previo en PRM sin logros
- NNA desea continuar en PAS
- Competencias y tiempo suficiente

PAS / PIE

- Además de PAS presenta otras CSP
- CSP involucra búsqueda o exposición a adultos
- Antecedentes familiares de Explotación/Comercio Sexual
- NNA frecuenta locales nocturnos o zonas rojas
- NNA en situación de calle o con prácticas de mendicidad
- NNA maneja bienes (dinero, regalos, cargas de celular, etc.) sin origen conocido
- Proceso previo en PRM sin logros

PEE

- PAS/CSP persistentes acompañadas de otros problemas de alta impulsividad
- Sospecha de Bipolaridad Infanto-juvenil
- Sospecha de TOC (obsesiones o compulsiones sexuales)
- Sospecha de TEPT (replicación de trauma sexual previo)
- Abuso de drogas o alcohol
- Sintomatología alucinaciones o riesgo suicida

SALUD
MENTAL